

# Orasel Zinc

## Traitement et prévention de la diarrhée

**Orasel Zinc**, deux sachets de sel de réhydratation au goût de fraise et dix comprimés de zinc sécables.

### COMPOSITION

Orasel Zinc à osmolarité réduite contient pour un sachet :

- 2,6 g de chlorure de sodium
- 13,5 g de glucose anhydre
- 1,5 g de chlorure de potassium
- 2,9 g de citrate trisodique dihydrate

Un comprimé de zinc contient 54,9 mg de sulfate de zinc correspondant à 20 mg de zinc élément.

Excipients : cellulose, amidon, édulcorant, silice, stéarate de magnésium.

### DANS QUEL CAS UTILISER ORASEL Zinc ?

Orasel Zinc est une solution orale de sel de réhydratation combinée avec du zinc pour la prise en charge de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans. Elle est indiquée lorsque l'enfant fait plus de selles liquides en **24 heures** que d'habitude.

### CARACTERISTIQUES

La solution de réhydratation Orasel traite les états de déshydratation chez l'enfant et remplace l'eau et les sels minéraux perdus dans les selles. Rappelez-vous que le sel de réhydratation Orasel est utilisé en association avec le zinc dès le début de la diarrhée pour un traitement et une prévention efficace.

La prise du zinc réduit la gravité et la durée de la diarrhée. Le zinc permet à l'enfant de récupérer très rapidement après les épisodes de diarrhée. Il est recommandé de donner à l'enfant les comprimés de zinc pendant dix (10) jours consécutifs même si la diarrhée se termine très tôt.

*Selon l'OMS, une prise régulière de zinc pendant dix jours réduit les épisodes diarrhéiques futurs pendant deux (2) ou trois (3) mois.*



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Maternal and Child Health  
Integrated Program



## POUR MIEUX PRENDRE EN CHARGE LA DIARRHÉE

### COMMENT UTILISER ORASEL Zinc ?

Orasel Zinc est très facile à utiliser en cas de diarrhée. Toute mère ou femme en charge d'enfants peut seule préparer la solution pour son enfant.

Avec des mains propres, il suffit de verser le contenu d'un sachet Orasel dans un litre d'eau propre ; remuer ensuite jusqu'à ce que le produit soit complètement dissout. Dès que la solution est prête, en donner à l'enfant à la cuillère, chaque fois qu'il a envie de boire et aussi après les selles.

Après, mettre un comprimé de zinc dans une cuillère à café propre ; ajouter un peu de lait maternel ou quelques gouttes d'eau. Laisser dissoudre le comprimé et donner à l'enfant tout le contenu de la cuillère.

### ! PRÉCAUTIONS SPÉCIALES

*Si l'enfant a moins de 6 mois, utiliser la moitié du comprimé une fois par jour pendant dix (10) jours consécutifs.*

*Si l'enfant a plus de 6 mois et a moins de 5 ans, utiliser un comprimé entier une fois par jour pendant dix (10) jours consécutifs.*

### i UTILE A SAVOIR

Il n'y a aucune contre indication connue à l'administration d'Orasel.

Cependant, les comprimés de zinc sont contre indiqués en cas d'allergie ou d'hypersensibilité au zinc ainsi qu'en cas de troubles fonctionnels rénaux sévères ou de décompensation rénale aigue.

Le zinc peut perturber l'absorption d'un groupe bien défini d'antibiotiques (les tétracyclines).

Par conséquent, ces antibiotiques doivent être pris avant ou au minimum cinq (5) heures après la prise des comprimés de zinc.

*Orasel Zinc au goût de fraise est en vente à 400F CFA  
dans les pharmacies, boutiques et centres de santé  
sans prescription médicale !!!*

**Toujours là pour nos enfants!**



# Orasel Zinc

